

Ceftri-lux®

ceftriaxone

Ceftriaxone 1000 mg, poudre pour solution injectable/ pour perfusion

Mode d'administration: Perfusion - injection intraveineuse - Injection Intramusculaire

En règle générale les solutions **CEFTRI-LUX®** doivent être administrées immédiatement après leur reconstitution sans les mélanger ou ajouter à d'autres agents. La solution de **CEFTRI-LUX®** ne devra pas être mélangé ni co-administrée avec d'injections contenant du calcium.

- Injection intramusculaire : dissoudre dans 3,5 ml de chlorhydrate de lidocaïne 1% (10 mg/ml) stérile.
- Injection Intraveineuse : dissoudre dans 10 ml d'eau stérile pour injection. La solution doit être administrée sur une période de 2 à 4 minutes.

Posologie habituelle

La dose de **CEFTRI-LUX®** dépend de la sévérité, de la sensibilité bactérienne, du site et du type d'infection, ainsi que de l'âge et de la fonction hépatique et rénale du patient.

La durée de traitement: l'administration de **CEFTRI-LUX®** doit être poursuivie 48 à 72 heures après la disparition de la fièvre chez le patient ou après l'obtention de l'éradication bactérienne.

	Dose de CEFTRI-LUX®	Fréquence (2)
à partir de 50 kg et adultes		
infections communautaires	1000 mg - 2000 mg	toutes les 12 h
infections nosocomiales	2000 mg - 4000 mg	toutes les 12 h
Méningite bactérienne	2000 mg - 4000 mg	toutes les 12 h
Prophylaxie pré-opératoire	Dose unique de 2000 mg	
Gonorrhée	Dose unique de 500 mg (IM)	
Nouveau nés (à terme) à partir de 2 semaines jusqu'à 12 ans (< 50kg)		
Infections communautaires et infections nosocomiales	50-100 mg/kg (max 4000 mg)	1 fois par jour
Méningite bactérienne	80-100 mg/kg (max 4000 mg)	1 fois par jour
Nouveaux-nés (à terme) de 0 à 14 jours		
	20-50 mg/kg	1 fois par jour

3LUX/CEFTRIF_L_1_2024_FINAL

Le temps durant lequel la concentration d'imipénem dépasse la CMI de la bactérie (T> CMI) est le paramètre le mieux corrélé avec l'efficacité.

Ceftri-lux®

ceftriaxone

Ceftriaxone 1000 mg, poudre pour solution injectable/ pour perfusion



CEFTRI-LUX®, la ceftriaxone de Lux Pharma

Détruisez les bactéries responsables d'infections sévères comme dans

- la méningite bactérienne
- la pneumonie communautaire ou nosocomiale
- l'otite moyenne aiguë
- les infections intra-abdominales et les infections urinaires compliquées
- les infections des os et des articulations
- les infections compliquées de la peau et des tissus mous
- les infections sexuellement transmissibles (gonorrhée - syphilis)
- l'endocardite bactérienne

**Quand les bactéries attaquent vos patients,
il est temps d'attaquer les bactéries**

Pour les infos sur nos autres produits,
veuillez consulter www.luxpharma.com
et créer votre compte personnel sur le site.



SCANNEZ

LUX
PHARMA

Ceftri-lux®

ceftriaxone

**Quand les bactéries attaquent vos patients,
il est temps d'attaquer les bactéries**



La ceftriaxone au prix très accessible

Boîte contenant 10 flacons

La poudre de **CEFTRI-LUX®** est de haute qualité et ne contient pas d'excipients

- Moindre risque de réactions allergiques
- Facilement utilisable dans de différents solvants
- **INJECTION INTRA VEINEUSE : EAU POUR PRÉPARATIONS INJECTABLES.**
- La solution reconstituée est de couleur légèrement jaune à jaune-brun. **CEFTRI-LUX®** ne doit pas être mélangé dans la même seringue avec un autre médicament.
- **PERFUSION INTRA VEINEUSE APRÈS DILUTION : solutions de perfusion sans calcium**
- Chlorure de sodium à 0,9%; glucose à 5% ; glucose à 5%+ chlorure de sodium à 0,9%, glucose à 5%+, chlorure de sodium à 0,45%; glucose à 10% ; eau pour préparations injectables.
- Il est indispensable de rincer la tubulure entre chaque administration.
- **POUR L'INJECTION PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE,**
- **CEFTRI-LUX®** est dissout dans 3,5 ml d'une solution de chlorhydrate de lidocaïne à 10 mg par ml.
- Par la suite, cette solution est administrée par voie intramusculaire profonde.

Ceftri-lux®

ceftriaxone



La solution adaptée à une multitude d'infections bactériennes

Enfants - Adultes

l'administration de **CEFTRI-LUX®** doit être poursuivie 48 à 72 heures après la disparition de la fièvre chez le patient ou après l'obtention de l'éradication bactérienne

Élimination compensatoire rénale – biliaire
Pas nécessaire d'adapter la posologie en cas d'insuffisance hépatique légère ou modérée ou d'insuffisance rénale.

CEFTRI-LUX® est uniquement disponible sur ordonnance.

Pour le RCP complet, veuillez scanner ce code QR.



SCANNEZ