

Para-lux®

paracétamol

Paracétamol 1000 mg/100 ml, solution pour perfusion

PARA-LUX® est réservé aux adultes, aux adolescents et aux enfants pesant plus de 33 kg.

PARA-LUX® est administré par voie intraveineuse par un professionnel de santé.

La dose quotidienne maximale s'applique aux patients ne recevant aucun autre produit à base de paracétamol et cette dose doit être ajustée en tenant compte de la prise éventuelle de ces produits.

L'intervalle minimal entre chaque administration doit être d'au moins 4 heures. Pour les patients souffrant d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine ≤ 30 ml/min) il est recommandé de d'allonger l'intervalle minimal entre chaque administration à 6 heures.

Poids du patient	Dose par administration	Volume par administration	Dose quotidienne maximale
> 33 kg et ≤ 50 kg	15 mg/kg	1.5 mg/kg	60 mg/kg sans dépasser 3 g
>50 kg avec des facteurs de risque supplémentaires d'hépatotoxicité	1 g	100 ml	3 g
>50 kg sans facteurs de risque supplémentaires d'hépatotoxicité	1 g	100 ml	4 g
Lorsqu'on administre du paracétamol à des patients souffrant d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine ≤ 30 ml/min), il est recommandé d'allonger l'intervalle minimal entre chaque administration à 6 heures.			

La solution de paracétamol est administrée au moyen d'une perfusion intraveineuse de 15 minutes.

Pour les infos sur nos autres produits, veuillez consulter
www.luxpharma.com et créer votre compte personnel sur le site.



Para-lux®

paracétamol

Paracétamol 1000 mg/100 ml, solution pour perfusion



PARA-LUX® est indiqué pour le traitement (à court terme) des douleurs d'intensité modérées lorsque la voie intraveineuse est cliniquement justifiée et/ou lorsque d'autres voies d'administration ne sont pas possibles.

En particulier en période post-opératoire et dans le traitement de courte durée de la fièvre.

Réduction rapide et significative de l'intensité de la douleur


Réduction de la consommation d'opioïdes

Excellent degré de satisfaction des patients

Para-lux®

paracétamol

Paracétamol 1000 mg/100 ml, solution pour perfusion



PARA-LUX®

- Concentrations plasmatiques plus élevées comparées aux autres voies d'administration.
- Concentration plasmatique maximale atteinte plus vite.

PARA-LUX®

- Action plus vite
- Action plus forte

Réduction rapide et prononcée de la douleur/fièvre



PARA-LUX® ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments.

Para-lux®

paracétamol

Paracétamol 1000 mg/100 ml, solution pour perfusion

Mode d'administration

Lorsqu'on prescrit et administre **PARA-LUX®** solution pour perfusion, veiller éviter les erreurs de dosage en raison d'une confusion entre les milligrammes (mg) et les millilitres (ml), qui pourraient donner lieu à un sur dosage accidentel.

La solution de **PARA-LUX®** est administrée au moyen d'une perfusion intraveineuse de 15 minutes. Pour prélever la solution, utiliser une aiguille (0,8 mm (21 G)) et perforer le bouchon à la verticale à l'endroit précisé. Avant administration, la solution doit être inspectée visuellement afin de détecter toute particule ou décoloration.

Comme pour toutes les solutions pour perfusion conditionnées dans des flacons en verre, il est rappelé qu'une surveillance étroite est nécessaire, particulièrement à la fin de la perfusion, quelle que soit la voie d'administration. Cette surveillance à la fin de la perfusion s'applique tout particulièrement aux perfusions administrées par voie centrale, de façon à éviter une embolie gazeuse.



Prix abordable

PARA-LUX® est uniquement disponible sur ordonnance.

Pour le RCP complet, veuillez scanner ce code QR.



SCANNEZ